

Příbalový informační leták

ARONTA 600 mg tablety
kurkumin-fosfolipidový komplex
doplňěk stravy

Aronta 600 mg tablety jsou vhodné jako doplňěk léčby při recidivující (opakovaně se vyskytující) přední uveitidě (uveitis anterior).¹

Chronická recidivující přední uveitida

Uveitida je zánět uvey (střední vrstva oka). V případě přední uveitidy zánět postihuje přední část oka, např. duhovku. Ohnisko zánětu se tedy nachází přímo v oku, na rozdíl od častého a známého povrchového zánětu spojivek (konjunktivitidy).

Príznaky přední uveitidy jsou: zarudlé oči, citlivost na světlo, bolesti až vážné postižení zraku. Relativně často je také zánět spojen s revmatickou chorobou.

Hlavní úlohou při léčbě tohoto stavu je rychle a účinně zmírnit zánět, aby se zabránilo případným komplikacím.

Jak kurkumin podporuje zdraví?

Protizánětlivé vlastnosti kurkuminu jsou již roky předmětem zkoumání. Díky nejnovějším výzkumům dnes víme, že kurkumin pozitivně ovlivňuje rovnováhu mezi protizánětlivými a prozánětlivými procesy v těle a přispívá k postupnému zmírnění zánětu přirozeným způsobem.

Nové výsledky výzkumů poukazují na to, že kurkumin pomáhá snižovat tvorbu nových cév, ke které dochází při mnohých zánětlivých procesech. Předpokládá se, že kurkumin má tento ochranný účinek i při dlouhotrvajícím diabetu (cukrovce), kdy dochází k nežádoucí tvorbě nových cév v oku.

Aby se využil tento pozitivní přínos kurkuminu pro zdraví, má se kurkumin-fosfolipidový komplex obsažený v doplňku stravy Aronta užívat dlouhodobě. V případech chronicky se opakujícího očního zánětu se doporučuje užívat přípravek Aronta alespoň 12 měsíců.

Dávkování

¹ P. Allegri, et al., Management of chronic anterior uveitis relapses: efficacy of oral phospholipidic curcumin treatment. Long-term follow-up. *Clinical Ophthalmology*, 2010:4, p. 1201–1206.

Doporučená denní dávka pro dospělé: 1 tableta denně. Doporučená denní dávka se nesmí překročit.

Poznámka: Pravidelné užívání doplňku stravy Aronta 600 mg při chronicky se opakující přední uveitidě se doporučuje minimálně po dobu jednoho roku, pokud lékař neurčí jinak.

Složení a energetické hodnoty

Jedna tableta doplňku stravy Aronta 600 mg obsahuje 600 mg kurkumin-fosfolipidového komplexu. Další složky jsou: mikrokrystalická celulóza, stearan hořečnatý.

Nutriční hodnota / složení	v 1 tabletě	v 100 g
Energetická hodnota	2,25 kcal / 9,21 kJ	375 kcal / 1535 kJ
Proteiny	0,02 g	3,6 g
Sacharidy	0,01g	1,22 g
Tuky	0,18 g	30,2 g
BE jednotka	0,01	

Má doplněk stravy Aronta 600 mg vedlejší účinky?

V současnosti nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Kdy se nemá doplněk stravy Aronta 600 mg užívat?

Doplněk stravy Aronta 600 mg se nemá užívat v případě, že jste alergičtí na kurkumin nebo na jakoukoliv jinou složku doplňku stravy Aronta 600 mg. Doplněk stravy není vhodný pro děti a dospívající. Doplněk stravy není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Doplněk stravy Aronta 600 mg je vhodný i pro diabetiky.

Doplněk stravy Aronta 600 mg neobsahuje laktózu ani lepek a mohou jej užívat také diabetici.

Důležité upozornění

Doplněk stravy se nesmí užívat jako náhrada pestré stravy.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25 ° C a chraňte před světlem.

Doplněk stravy se užívá na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem.

Výrobce:

Pharmaselect Handels GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko

Distributor pro ČR: Pharmaselect CZ s.r.o., Vinohrady 53, 639 00 Brno

Další informace naleznete na www.pharmaselect.cz